

Cuidados postoperatorios

CircCurer

01

Se recomienda permanecer en observación durante los 30 minutos posteriores a la operación, el vendaje elástico exterior puede retirarse 2 horas después de la operación (adecuado para vendajes de presión con vendaje elástico de doble capa)

09

La vida sexual debe detenerse dentro de los 30 días posteriores a la cirugía.

02

Los pacientes deben descansar después de la cirugía, prestar atención a la higiene y prevenir la inflamación.
Evite las actividades extenuantes, a fin de evitar hematomas y hemorragias causadas por el aflojamiento de la gasa o el vendaje en poco tiempo después de la cirugía.
En caso de hematomas y hemorragias graves, es necesario volver al hospital para recibir tratamiento.

08

Después de la cirugía, las grapas de sutura se retirarán por sí solas. En general, la retirada comienza a los 7 días. Debido a la diferencia de constitución física individual, en casos especiales, si las grapas no se retiran completamente en 30 días, los pacientes pueden retirar las grapas restantes por sí mismos o volver al hospital.

03

Se deben usar pantalones sueltos después de la cirugía para evitar presionar la herida. El paciente también puede usar pantalones de cuidado postoperatorio a la circuncisión para proteger las heridas.

07

Después de quitar todas las vendas, limpie la herida con Betadine, de 3 a 5 veces al día para desinfectarla y prevenir la infección.

04

Después de la cirugía, es necesario comer alimentos ligeros, evitar el alcohol y los alimentos picantes, y complementar adecuadamente los alimentos ricos en proteínas como la carne, la leche, los huevos y las aves de corral para promover la cicatrización de la herida.

06

Cambiar el apósito según el consejo del médico (esta recomendado cambiar el apósito como máximo una vez), si hay sangrado en la herida y el apósito está contaminado, es necesario cambiar el apósito a tiempo.

05

En caso de cualquier situación especial después de la cirugía, como hemorragias continuas, disuria y edema de pene, por favor, póngase en contacto con el médico a tiempo.

Preguntas frecuentes

¿CÓMO TRATAR UNA HEMORRAGIA POSTOPERATORIA?

Una pequeña cantidad de sangrado es normal y no necesita tratamiento; si el sangrado continúa, el paciente debe regresar al hospital para ser tratado inmediatamente.

¿CÓMO TRATAR UN EDEMA POSTOPERATORIO?

El edema postoperatorio es un fenómeno normal. Si no hay una agravación progresiva del edema y el hematoma, no hay necesidad de tratarlos, se absorberá naturalmente y curará en unos pocos días. Evitar que el glande frote en los pantalones para proteger el edema.

¿CÓMO LIDIAR CON LOS FLUIDOS DE LA HERIDA EN LA SUPERFICIE DEL GLANDE?

Los fluidos de la herida se observan sobre todo en pacientes con fimosis o con adherencias del prepucio. Puede producirse exudación de secreción de color amarillo y blanco en el glande después de la cirugía, siendo un fenómeno normal sin que haya necesidad de preocuparse. Use un bastoncillo de algodón sumergido en ungüento de eritromicina para limpiar la secreción, no fuerce la caída de la costra, manténgala seca y limpia hasta que caiga naturalmente.

¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE EL BAÑO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?

No debe bañarse en los 3 días posteriores a la cirugía. Envuelva el pene con una lámina o un condón cuando se bañe después de quitarse el vendaje. Trate de no mojar o contaminar la herida. Si la herida está húmeda, séquela con un bastoncillo de algodón o un secador de pelo y desinféctela con Betadine.



Distribuido por:



CIRCCURER™



LANGHE MEDICAL

DISPOSITIVO DESECHABLE DE SUTURA DE CIRCUNCISIÓN

MANUAL DE CUIDADOS POSTOPERATORIOS